

HRTで用いる製剤

女性ホルモン製剤

- 経口剤
プレマリン・ジュリナ
- 経皮剤
エストラーナ・
ル・エストロジェル
- 錠剤
エストリオール

+

黄体ホルモン製剤

- 酢酸メドロキシプロ
ゲステロン
ヒスロン・プロベラ
- ジヒドロゲステロン
デュファストン

女性ホルモン製剤



黄体ホルモン製剤



女性ホルモン・黄体ホルモン 配合製剤



HRT投与方法(1)

1)エストロゲン単独療法(子宮摘出後にのみ行う)

- 持続的投与方法

- 間欠的投与方法

21日～25日投与

5～7日
休薬

21日～25日投与

5～7日
休薬

HRT投与方法(2)

1)エストロゲン・プロゲステロン併用療法


- 間欠的投与方法



- 持続法



- 持続併用投与方法



HRTの有害事項

- 不正性器出血
- 乳房痛
- 片頭痛
- 乳癌
- 子宮体癌
- 心筋梗塞
- 虚血性脳卒中
- 静脈血栓塞栓症

HRTを考えないといけない場合

HRTができない場合

- 重度の活動性肝疾患
- 現在の治療中の乳癌とその既往
- 現在の治療中の子宮体癌、
低悪性子宮内膜間質肉腫
- 原因不明の不正性器出血
- 妊娠が疑われる場合
- 静脈血栓塞栓症
- 心筋梗塞、動脈硬化症の既往
- 脳卒中の既往

HRTを慎重におこなわないと いけない場合

- 子宮体癌の既往
- 卵巣癌の既往
- 子宮筋腫、子宮内膜症の既往
- 肥満
- 血栓症のリスクを有する場合
- 冠痙攣および微小血管狭心症の既往
- 慢性肝疾患
- 胆のう炎、胆石の既往
- 重症のトリグリセリド血症
- コントロール不良な糖尿病、高血圧
- 片頭痛