

レジメン名 (治療名) CMF 療法 (シクロホスファミド+メソトレキサート+フルオロウラシル)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
乳癌	CMF 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1 日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8 等)
1	メソトレキサート 【MTX】	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	20 分	Day1、8
2	フルオロウラシル 【5FU】	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	20 分	Day1、8
3	シクロホスファミド 【CPA】	100mg/m <sup>2</sup>	経口		Day1~14
1 コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4 週間			
総コース数及び総投与量の限界		術前後：6 コース 進行再発：制限なし			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン			
備考		制吐剤は原則なし。随時追加対応。			

《投与順》

Day1、8

- |             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| (1) 生理食塩液   | 50mL                 |      |
| デキサメタゾン 8mg | 1V                   | 30 分 |
| (2) 生理食塩液   | 50mL                 |      |
| メソトレキサート    | 40mg/m <sup>2</sup>  | 20 分 |
| (3) 生理食塩液   | 50mL                 |      |
| フルオロウラシル    | 600mg/m <sup>2</sup> | 20 分 |
| (4) 生理食塩液   | 50mL                 | 5 分  |

経口抗がん剤

シクロホスファミド錠 50mg    100mg/m<sup>2</sup>    分 1    day1~14

\* 体表面積 1.5 m<sup>2</sup>未満：100mg (2 錠)、1.5 m<sup>2</sup>以上：150mg (3 錠)