

レジメン名 (治療名)					
ドセタキセル					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
乳癌	DTX	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ドセタキセル【DTX】	60-75mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		術前後：4コース 進行再発：制限なし			
プレメディケーション ポストメディケーション		制吐剤：ファモチジン、デキサメタゾン 浮腫予防：デキサメタゾン 4mg 経口投与 3回分			
備考		ドセタキセル点滴投与開始 10分は速度を遅めにして、全身状態を観察する。異常がなければ、投与速度を戻して投与する。 浮腫予防のデキサメタゾンは1回8錠 3回分で処方。			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
(2) 生理食塩液	50mL	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(3) 5%ブドウ糖液	250mL	
ドセタキセル	60-75mg/m ²	1時間
(4) 生理食塩液	50mL	10分

支持療法

浮腫予防：点滴終了後 12時間ごとにデキサメタゾン 4mg を経口投与 (3回程度)

点滴当日夕・翌日朝夕食後に内服