

レジメン名 (治療名)					
パクリタキセル・ベバシズマブ					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
乳癌	PTX+BEV	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	パクリタキセル【PTX】	90mg/m ²	点滴静注	60分	Day1、8、15
2	ベバシズマブ【BEV】	10mg/kg	点滴静注	90分 2回目以降60分 3回目以降30分	Day1、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、ファモチジン クロルフェニラミン			
備考		・パクリタキセル中止後は、病勢の増悪または許容できない毒性が発現するまでベバシズマブの単独継続投与可能			

≪投与順≫

Day1、15

- | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 50mL | |
| ファモチジン 20mg | 1A | |
| オンダンセトロン 4mg | 1A | |
| クロルフェニラミン 5mg | 1A | |
| デキサメタゾン 8mg | 1V (初回 2V) | 15分 |
| (2) 5%ブドウ糖液 | 250mL | |
| パクリタキセル | 90mg/m ² | 60分 |
| (3) 生理食塩液 | 100mL | |
| ベバシズマブ | 10mg/kg | 90分 |
| * 忍容性認めた場合は2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能 | | |
| (4) 生理食塩液 | 50mL | 5分 |

Day8

(1) 生理食塩液	50mL	
ファモチジン 20mg	1A	
オンダンセトロン 4mg	1A	
クロルフェニラミン 5mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V (初回 2V)	15 分
(2) 5%ブドウ糖液	250mL	
パクリタキセル	90mg/m ²	60 分
(3) 生理食塩液	50mL	5 分