

レジメン名 (治療名)					
TC 療法 (ドセタキセル+シクロホスファミド)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
乳癌	TC 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1 日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8 等)
1	ドセタキセル【DTX】	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60 分	Day1
2	シクロホスファミド【CPA】	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30 分	Day1
1 コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3 週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		術後補助化学療法：4 コース 進行再発：制限なし			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、ファモチジン ドセタキセルの浮腫予防服用：内服デキサメタゾン			
備考		原則内服制吐剤なし。			

《投与順》

- |              |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| (1) 生理食塩液    | 100mL                |      |
| オンダンセトロン 4mg | 1A                   | 15 分 |
| (2) 生理食塩液    | 50mL                 |      |
| ファモチジン 20mg  | 1 A                  |      |
| デキサメタゾン 8mg  | 1 V                  | 30 分 |
| (3) 5%ブドウ糖液  | 250mL                |      |
| ドセタキセル       | 75mg/m <sup>2</sup>  | 60 分 |
| (4) 生理食塩液    | 100mL                |      |
| シクロホスファミド    | 600mg/m <sup>2</sup> | 30 分 |
| (5) 生理食塩液    | 50mL                 | 10 分 |

浮腫予防

デキサメタゾン 0.5 mg 1 回 8 錠 (投与日夕食後、投与翌日朝・昼食後) 3 回分