

レジメン名 (治療名)					
トラスツズマブ エムタンシン					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
乳癌	T-DM1	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	トラスツズマブ エムタンシン 【T-DM1】	3.6mg/kg	点滴静注	90分 2回目以降30分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		原則なし			
備考		<p>・HER2陽性のトラスツズマブ、タキサン系薬剤の治療歴のある患者が対象。</p> <p>・1コース目のday8に血小板数、肝機能検査の採血を実施することが望ましい。(1コース目のday8が最も血小板減少、肝機能低下の頻度が高いと報告があるため)</p>			

《投与順》

- | | | | |
|-----|---------------------------|----------|-----|
| (1) | 生理食塩液 | 50mL | 5分 |
| (2) | 生理食塩液 | 250mL | |
| | トラスツズマブエムタンシン | 3.6mg/kg | 90分 |
| | * 忍容性を認めた場合、2回目以降30分へ短縮可能 | | |
| (3) | 生理食塩液 | 50mL | 5分 |