

レジメン名 (治療名)					
SOX (S1+オキサリプラチン) +BEV					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
大腸癌	SOX+BEV	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ベバシズマブ【BEV】	7.5mg/kg	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分	Day1
1	オキサリプラチン 【L-OHP】	130mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1
2	エヌケーエスワン【S1】	80mg/m ² /day	内服	朝夕食後	Day1 (夕) ~ Day15 (朝) 14日分
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと (LOHP: day1、S1: day1 (夕) ~15 (朝) 内服後1週間休薬)			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン、アプレピタント			
備考		・血管予防のため、末梢点滴時はブドウ糖液 500mL にデキサメタゾン 8mg0.5V を追加する。			

《投与順》

- (1) 生理食塩液 50mL
 デキサメタゾン 8mg 2V
 ファモチジン 20mg 1A
 クロルフェニラミン 5mg 1A
 オンダンセトロン 4mg 1A 30分
- (2) 生理食塩液
 ベバシズマブ 7.5mg/kg 90分 (初回) **
 **2回目 60分、3回目 30分へ短縮可能
- (2) 5%ブドウ糖液 500mL
 デキサメタゾン 8mg (ポート留置者不要) 0.5V
 オキサリプラチン 130mg/m² 2時間
- (3) 生理食塩液 50mL 5分

内服抗がん剤: S1 80mg/m²/day 1日2回 朝夕食後 14日分

内服制吐剤: アプレピタントカプセル 125mg 1Cap分1 1日分

アプレピタントカプセル 80mg 1Cap分1 2日分