<table>
<tr><td colspan="6">レジメン名（治療名）
CPT11（イリノテカン）</td></tr>
<tr><td>癌腫</td><td>レジメン（略語）</td><td>実施区分</td><td colspan="3">抗がん剤適応区分</td></tr>
<tr><td>胃癌</td><td>CPT11</td><td>■入院
■外来</td><td colspan="2">■進行・再発
□術後補助化学療法
□術前補助化学療法</td><td>□大量化学療法
□局所化学療法
□その他</td></tr>
<tr><td>投与順</td><td>抗がん剤名
（商品名・略称）</td><td>1 日投与量</td><td>投与経路</td><td>投与時間</td><td>投与日
（day1、8 等）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>イリノテカン
【CPT11】</td><td>100mg/㎡</td><td>点滴静注</td><td>90 分</td><td>Day 1 、 8 、 1 5</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 コースの期間
（次コースまでの標準期間）</td><td colspan="4">4 週間</td></tr>
<tr><td colspan="2">総コース数及び総投与量の限界</td><td colspan="4">なし</td></tr>
<tr><td colspan="2">プレメディケーション
ポストメディケーション</td><td colspan="4">5HT3 拮抗薬
・下痢の副作用軽減を目的に下記の処方も検討
ウルソデオキシコール酸 100mg　3 錠分 3
重曹　1.8g 分 3
メトクロプラミド 5mg　3 錠分 3　4 日分投与</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="4">外来化学療法の場合、投与間隔が 2 週間（day1 投与後、2 週間休薬）と調節する場合あり。</td></tr>
</table>

≪投与順≫

（1） 生理食塩液　50mL
　　オンダンセトロン 4mg　1A　30 分

（2） 5 %ブドウ糖液　500mL
　　イリノテカン　100mg/㎡　90 分

（3）生理食塩液　50mL　5 分