

レジメン名 (治療名)					
ドセタキセル (DTX)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	DTX	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ドセタキセル【DTX】	60-75mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1
コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		制吐剤：オンダンセトロン、デキサメタゾン 浮腫予防：投与後約12時間おきにデキサメタゾン4mgを経口投与 投与当日夕、翌日朝夕食後の計3回内服する			
備考		・ドセタキセル投与開始から10分間は、速度を遅めて全身状態を観察。異常がないことを確認して、投与速度通常速度に戻す。			

≪投与順≫

(1) 生理食塩液	50mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
(2) 生理食塩液	50mL	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(3) 5%ブドウ糖液	250mL	
ドセタキセル	60-75mg/m ²	1時間
(4) 生理食塩液	50mL	10分

内服薬：デキサメタゾン 0.5mg 1回8錠 3回分 (浮腫予防目的)

投与当日夕、翌日朝夕食後服用の計3回