

レジメン名 (治療名)					
PTX+RAM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	PTX+RAM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ラムシルマブ【RAM】	8mg/kg	点滴静注	60分	Day1、15
2	パクリタキセル【PTX】	80mg/m ²	点滴静注	60分	Day1、8、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン			
備考		・サイラムザ投与中の infusion reaction 発現時の対応 Grade1 or 2→サイラムザの投与速度を 50%減速 Grade3 or 4→サイラムザの投与を直ちに中止 ・サイラムザ：10%以上体重の変動があった場合は、投与量を検討			

≪投与順≫

Day1、15

(1) 生理食塩液	100mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	
ファモチジン 20mg	1A	
クロルフェニラミン 5mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 生理食塩液	50mL	5分
(3) 生理食塩液	250mL	
ラムシルマブ	8mg/kg	60分 (2回目以降 30分)
(4) 生理食塩液	50mL	60分 (2回目以降 5分)
(5) 生理食塩液	250mL	
パクリタキセル	80mg/m ²	60分
(6) 生理食塩液	50mL	5分

Day8

(1) 生理食塩液	50mL	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 生理食塩液		
パクリタキセル	80mg/m ²	60分
(3) 生理食塩液	50mL	5分

*内服制吐剤：原則なし