

レジメン名 (治療名)					
SOX 療法 (S1+オキサリプラチン)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	SOX	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	オキサリプラチン 【L-OHP】	100mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1、
2	エヌケーエスワン【S1】	80mg/m ² /day	内服	朝夕食後	Day1 (夕) ~ Day15 (朝) 14日分
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと (LOHP: day1、S1: day1 (夕) ~15 (朝) 内服後1週間休薬)			
総コース数及び総投与量の限界		術後: 8コース 進行再発: PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン、アプレピタント			
備考		・血管予防のため、末梢点滴時はブドウ糖液 500mL にデキサメタゾン 8mg0.5V を追加する。			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL	
デキサメタゾン 8mg	2V	
ファモチジン 20mg	1A	
クロルフェニラミン 5mg	1A	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
(2) 5%ブドウ糖液	500mL	
デキサメタゾン 8mg (ポート留置者不要)	0.5V	
オキサリプラチン	100mg/m ²	2時間
(3) 生理食塩液	50mL	10分

内服抗がん剤: S1 80mg/m²/day 1日2回 朝夕食後 14日分

内服制吐剤: アプレピタントカプセル 125mg 1Cap分1 1日分

アプレピタントカプセル 80mg 1Cap分1 2日分