

レジメン名 (治療名)					
GEM+S1					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
膵癌	GEM+S1	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ゲムシタビン【GEM】	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8
	S1	80 or 100mg/body	経口内服		Day1~14
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン			
備考		・血管痛軽減目的に GEM は 5%ブドウ糖液で希釈。			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL		
オンダンセトロン 4mg	1A		
デキサメタゾン 8mg	1V	30分	
(2) 5%ブドウ糖液	100mL		
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	
(3) 生理食塩液	50mL	5分	

内服

S1 80 or 100mg/day 分2 朝夕 14日間 (day1 夕~day15 朝)