

レジメン名 (治療名)					
エンホルツマブ ベドチン (EV)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
尿路上皮癌	エンホルツマブ ベドチン (EV)	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	エンホルツマブ ベドチン 【EV・パドセブ】	1.25mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間おき			
総コース数及び総投与量の限界		制限なし・PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		なし			
備考		Infusion reaction の既往歴がある患者には、本剤投与の30～60分前に前投薬として解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬、副腎皮質ホルモン剤などの薬剤追加を推奨する。			

《投与順》

- | | | | |
|-----|--------------|-----------|-----|
| (1) | 生理食塩液 | 50mL | 5分 |
| (2) | 生理食塩液 | 250mL | |
| | エンホルツマブ ベドチン | 1.25mg/kg | 30分 |
| (3) | 生理食塩液 | 50mL | 5分 |

処方薬

ヘパリン類似物質油性クリーム 1日2回 2本