

レジメン名 (治療名)					
CDDP+PEM+BEV Short hydration					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
非小細胞 非扁平上皮 肺癌	CDDP+PEM+BEV	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ベバシズマブ【BEV】	15mg/kg	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分 〜短縮可能	Day1
2	ペメトレキセド【PEM】	500mg/m ²	点滴静注	12分	Day1
3	シスプラチン【CDDP】	80mg/m ²	点滴静注	60分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		CDDP+PEM+BEV を4~6コース施行。 施行後、PEM+BEV療法を3週間おきにPDまで継続。			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、ファモチジン、パロノセトロン マンニトール、硫酸Mg補正液、アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・ 飲水指示：1日目から3日目に飲水 1000mL/day を行う。経口補液 OS1 での補給を推奨。 ・ 以下の条件を満たしていることを確認。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 年齢 75 歳以下 2) PS0-1 3) 心エコーによる左室駆出率 50%以下、拡張障害は除外 4) 肝機能、腎機能正常 5) 処置を必要とする胸水・心嚢水がない 6) 除外：上大動脈症候群、肺全摘、コントロール不良のDM 			

《投与順》

(1)	生理食塩液	50mL	5分
(2)	生理食塩液	100mL	
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分
* 忍容性を認めた場合は2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能			
(3)	ソルデム 1液	500mL	1時間
(4)	ソルデム 3A液	500mL	
	硫酸 Mg 補正液	8mEq	1時間
(5)	生理食塩液	100mL	
	パロノセトロン 0.75mg	1V	
	ファモチジン 20mg	1A	
	デキサメタゾン 8mg	1.5V	15分
(6)	生理食塩液	50mL	
	ペメトレキセド	500mg/m ²	12分
(5)	マンニトール 20%	200mL	30分
(6)	生理食塩液	300mL	
	シスプラチン	75mg/m ²	1時間
(7)	ソルデム 1液	500mL	1時間
制吐剤：アプレピタント 125mg 1Cap 分1 1日分			
	アプレピタント 80mg	1Cap 分1	2日分
	デキサメタゾン 0.5mg	16錠分2	2日分

維持療法

(1)	生理食塩液	50mL	5分
(2)	生理食塩液	100mL	
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分
* 忍容性を認めた場合は2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能			
(3)	生理食塩液	100mL	
	ファモチジン 20mg	1A	
	デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(4)	生理食塩液	100mL	
	ペメトレキセド	500mg/m ²	12分
(5)	生理食塩液	50mL	5分