

レジメン名 (治療名)					
CBDCA+S1					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
非小細胞肺癌	CBDCA+S1	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=5	点滴静注	1時間	Day1
2	エヌケーエスワン【S1】	40~60mg/回	経口内服		Day1~14
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3~4週ごと S1内服方法：2週間内服した後に1週間または2週間の休薬			
総コース数及び総投与量の限界		4~6コース			
プレメディケーション ポストメディケーション		パロノセトロン、デキサメタゾン、ファモチジン			
備考		CBDCA 関連事項 ・投与量は AUC=6 が 400mg/m <sup>2</sup> 以上になる場合、400mg/m <sup>2</sup> ×体表面積で計算する。 ・内服制吐剤は症状に合わせて、アプレピタント投与可能。その際には、day2、3のデキサメタゾンの内服は省略可能。			

《投与順》

Day1

(1) 生理食塩液	50mL	
パロノセトロン 0.75mg	1A	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 5%ブドウ糖液	250mL	
カルボプラチン	AUC=5	60分
(3) 生理食塩液	50mL	5分

S1 40~60mg/回 1日2回 朝夕食後 Day1~14 連日内服