

レジメン名 (治療名)					
RAM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	RAM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ラムシルマブ【RAM】	8mg/kg	点滴静注	60分	Day1、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		2週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		クロルフェニラミン			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・ラムシルマブ投与中の infusion reaction 発現時の対応 Grade1 or 2→ラムシルマブの投与速度を 50%減速 Grade3 or 4→ラムシルマブの投与を直ちに中止 ・ラムシルマブ：10%以上体重の変動があった場合は投与量を検討 			

《投与順》

- | | | | |
|---------------|--------|---------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 100mL | | |
| クロルフェニラミン 5mg | 1A | | 15分 |
| <hr/> | | | |
| (2) 生理食塩液 | 250mL | | |
| ラムシルマブ | 8mg/kg | | 1時間 |
| <hr/> | | | |
| (3) 生理食塩液 | 50mL | 初回 1時間 (2回目以降 | 5分) |

内服制吐剤：原則なし