

レジメン名 (治療名)					
SOX (S1+オキサリプラチン) +Trastuzumab					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	SOX +Trastuzumab	■入院 ■外来	■進行・再発 □術後補助化学療法 □術前補助化学療法	□大量化学療法 □局所化学療法 □その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注	30分 初回90分	Day1
1	オキサリプラチン 【L-OHP】	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	Day1
2	エヌケーエスワン【S1】	80mg/m <sup>2</sup> /day	内服	朝夕食後	Day1(夕)～ Day15(朝)14日分
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと (LOHP: day1、Trastuzumab: day1 S1: day1(夕)～15(朝)内服後1週間休薬)			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン			
備考		・血管予防のため、末梢点滴時はブドウ糖液 500mL にデキサメタゾン 0.5V を追加する。			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL	5分
(2) 生理食塩液	250mL	
トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	90分 (2回目以降30分)
(3) 生理食塩液	50mL	
デキサメタゾン 8mg	2V	
ファモチジン 20mg	1A	
クロルフェニラミン 5mg	1A	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
(4) 5%ブドウ糖液	500mL	
デキサメタゾン 8mg (ポート留置者不要)	0.5V	
オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	2時間
(5) 生理食塩液	50mL	5分

内服抗がん剤: S1 80mg/m<sup>2</sup>/day 1日2回 朝夕食後 14日分

内服制吐剤：原則なし。悪心が出現するようであれば、下記の処方検討する。

アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分

アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分

\*オキサリプラチンが投与不可の場合に下記の投与順で行う

(1) 生理食塩液 50mL 5分

(2) 生理食塩液 250mL

トラスツズマブ 6mg/kg 30分

(3) 生理食塩液 50mL 5分

内服抗がん剤：S1 80mg/m<sup>2</sup>/day 1日2回 朝夕食後 14日分