

レジメン名 (治療名)					
CDDP+RT (CCRT)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
子宮頸癌	CCRT	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	シスプラチン【CDDP】	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間 Short 1時間	Day1、8、15、22、29、36
放射線	外照射	1.8Gy		全28回	平日。外照射の総照射量が30Gy越えてから 腔内照射へ。
	腔内照射	6Gy		全4回	
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		週1回投与			
総コース数及び総投与量の限界		6コースまで。			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、パロノセトロン、アプレピタント 硫酸Mg補正液、マンニトール			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>放射線：外照射50-60Gy、腔内照射24Gyとする。放射線量は変更になる可能性あり。</li> <li>CDDPの投与量の最大投与量は80mg/bodyとする。</li> <li>day1~3にかけて飲水1000mL/day以上可能な患者で明らかな心機能低下がない。</li> </ul>			

≪投与順≫

(1)	生理食塩液	500mL	1時間
(2)	ソルデム 3A 輸液	500mL	
	硫酸 Mg 補正液	8mEq	1時間
(3)	生理食塩液	50mL	
	パロノセトロン 0.75mg	1A	
	デキサメタゾン 8mg	1.5V	15分
(4)	マンニトール 20%	200mL	30分
(5)	生理食塩液	500mL	
	シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup>	1時間
(6)	生理食塩液	500mL	1時間

内服制吐剤

アプレピタントカプセル 125mg	1Cap 分 1	1日分
アプレピタントカプセル 80mg	1Cap 分 1	2日分
デキサメタゾン 0.5 mg	16錠 分 2	2日分 (Day2、3)