

レジメン名 (治療名)					
DC 療法					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
子宮頸癌	DC 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1 日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8 等)
1	ドセタキセル【DOC】	70mg/m ²	点滴静注	2 時間	Day1
2	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=4~5	点滴静注	1 時間	Day1
1 コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4 週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		6 クールまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、オンダンセトロン、デカドロン アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・CBDCA アレルギーが出現した場合は、DTX 単剤となる。その際には軽度催吐性のため、アプレピタントの処方なし。 ・ドセタキセルは初回投与時にアレルギー反応を起こすことがあるため、開始 10 分は投与速度を遅くする。 			

《投与順》

- | | | |
|--------------|---------------------|------|
| (1) 生理食塩液 | 50mL | |
| ファモチジン 20mg | 1A | |
| デキサメタゾン 8mg | 3V | 15 分 |
| (2) 生理食塩液 | 100mL | |
| オンダンセトロン 4mg | 1A | 30 分 |
| (3) 生理食塩液 | 500mL | |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 2 時間 |
| (4) 5%ブドウ糖液 | 250mL | |
| カルボプラチン | AUC=4~5 | 1 時間 |
| (5) 生理食塩液 | 50mL | 5 分 |

内服制吐剤

- | | | |
|-------------------|----------|------|
| アプレピタントカプセル 125mg | 1Cap 分 1 | 1 日分 |
| アプレピタントカプセル 80mg | 1Cap 分 1 | 2 日分 |