

| レジメン名 (治療名) | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---|--|------------------|
| TC 療法 | | | | | |
| 癌腫 | レジメン (略語) | 実施区分 | 抗がん剤適応区分 | | |
| 子宮頸癌 | TC 療法 | <input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法 | <input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | |
| 投与順 | 抗がん剤名 (商品名・略称) | 1日投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 (day1、8等) |
| 1 | パクリタキセル【PTX】 | 175mg/m ² | 点滴静注 | 3時間 | Day1 |
| 2 | カルボプラチン【CBDCA】 | AUC=5 | 点滴静注 | 1時間 | Day1 |
| 1コースの期間 (次コースまでの標準期間) | | 3~4週間ごと | | | |
| 総コース数及び総投与量の限界 | | 6クールまで。 | | | |
| プレメディケーション ポストメディケーション | | デキサメタゾン、オンダンセトロン、ファモチジン クロルフェニラミン、アプレピタント | | | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・CBDCA アレルギーが出現した場合は、PTX 単剤へ変更。その際には軽度催吐性のため、アプレピタントの処方なし。 ・CBDCA の投与量は主治医の判断で AUC=6 まで増量可能。 | | | |

《投与順》

| | | | |
|---------------|----------------------|-----|--|
| (1) 生理食塩液 | 50mL | | |
| ファモチジン 20mg | 1A | | |
| デキサメタゾン 8mg | 3V | 15分 | |
| (2) 生理食塩液 | 100mL | | |
| クロルフェニラミン 5mg | 1A | | |
| オンダンセトロン 4mg | 1A | 30分 | |
| (3) 生理食塩液 | 500mL | | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 3時間 | |
| (4) 5%ブドウ糖液 | 250mL | | |
| カルボプラチン | AUC=5 | 1時間 | |
| (5) 生理食塩液 | 50mL | 5分 | |

内服制吐剤

| | | |
|-------------------|----------|-----|
| アプレピタントカプセル 125mg | 1Cap 分 1 | 1日分 |
| アプレピタントカプセル 80mg | 1Cap 分 1 | 2日分 |