

レジメン名 (治療名)					
DC 療法					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
子宮体癌	DC 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ドセタキセル【DOC】	70mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1
2	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=4~5	点滴静注	1時間	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3~4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		6クールまで。			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、オンダンセトロン、ファモチジン アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・CBDCA アレルギーが出現した場合は、DTX 単剤となる。その際には軽度催吐性のため、アプレピタントの処方なし。 ・ドセタキセルは初回投与時にアレルギー反応を起こすことがあるため、開始 10 分は投与速度を遅くする。 ・CBDCA の投与量は主治医の判断で AUC=6 まで増量可能。 			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1.5V	15分
(2) 生理食塩液	100mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
(3) 生理食塩液	500mL	
ドセタキセル	70mg/m ²	2時間
(4) 5%ブドウ糖液	250mL	
カルボプラチン	AUC=5	1時間
(5) 生理食塩液	50mL	5分

内服制吐剤

アプレピタントカプセル 125mg	1Cap 分 1	1日分
アプレピタントカプセル 80mg	1Cap 分 1	2日分