

レジメン名 (治療名)					
DXR					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
子宮体癌	DXR	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ドキシソルビシン【DXR】	60mg/m ²	点滴静注	5分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3~4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		投与限界：アンスラサイクリン総投与量 500mg/m ² まで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン (点滴、内服)			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・アンスラサイクリン系薬剤のため、投与前に心エコーを行う。 ・血管外漏出時は、デクスラゾキサンのリスクとベネフィットの説明を行い、使用が決まった際には血管外漏出後6時間以内に投与をする。 			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	2V	15分
(2) 生理食塩液	50mL	
ドキシソルビシン	60mg/m ²	5分
(3) 生理食塩液	50mL	5分

内服制吐剤

デキサメタゾン 0.5mg 16錠分2 朝昼食後 2日分

制吐コントロール不良時

アプレピタントカプセル 125mg 1Cap分1 1日分
 アプレピタントカプセル 80mg 1Cap分1 2日分