

レジメン名 (治療名)					
TC 療法					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
子宮体癌	TC 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	パクリタキセル【PTX】	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	Day1
2	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=5	点滴静注	1時間	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3~4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		6クールまで。			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、オンダンセトロン、ファモチジン クロルフェニラミン、アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・CBDCA アレルギーが出現した場合は、PTX 単剤へ変更。その際には軽度催吐性のため、アプレピタントの処方なし。</li> <li>・CBDCA の投与量は主治医の判断で AUC=6 まで増量可能。</li> </ul>			

《投与順》

- |               |                      |     |
|---------------|----------------------|-----|
| (1) 生理食塩液     | 50mL                 |     |
| ファモチジン 20mg   | 1A                   |     |
| デキサメタゾン 8mg   | 3V                   | 15分 |
| (2) 生理食塩液     | 100mL                |     |
| クロルフェニラミン 5mg | 1A                   |     |
| オンダンセトロン 4mg  | 1A                   | 30分 |
| (3) 生理食塩液     | 500mL                |     |
| パクリタキセル       | 175mg/m <sup>2</sup> | 3時間 |
| (4) 5%ブドウ糖液   | 250mL                |     |
| カルボプラチン       | AUC=5                | 1時間 |
| (5) 生理食塩液     | 50mL                 | 5分  |

内服制吐剤

- |                   |          |     |
|-------------------|----------|-----|
| アプレピタントカプセル 125mg | 1Cap 分 1 | 1日分 |
| アプレピタントカプセル 80mg  | 1Cap 分 1 | 2日分 |