

レジメン名 (治療名)					
DC 療法					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
卵巣癌	DC 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ドセタキセル【DOC】	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	Day1
2	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=4~5	点滴静注	1時間	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		6クールまで。6ヶ月以上あけて再発した場合に再開可能。			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、オンダンセトロン、デカドロン アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・CBDCA アレルギーが出現した場合は、DTX 単剤となる。その際には軽度催吐性のため、アプレピタントの処方なし。</li> <li>・ドセタキセルは初回投与時にアレルギー反応を起こすことがあるため、開始 10 分は投与速度を遅くする。</li> </ul>			

《投与順》

- |              |                     |     |
|--------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液    | 50mL                |     |
| ファモチジン 20mg  | 1A                  |     |
| デキサメタゾン 8mg  | 3V                  | 15分 |
| (2) 生理食塩液    | 100mL               |     |
| オンダンセトロン 4mg | 1A                  | 30分 |
| (3) 生理食塩液    | 500mL               |     |
| ドセタキセル       | 70mg/m <sup>2</sup> | 2時間 |
| (4) 5%ブドウ糖液  | 500mL               |     |
| カルボプラチン      | AUC=4~5             | 1時間 |
| (5) 生理食塩液    | 50mL                | 5分  |

内服制吐剤

- |                   |          |     |
|-------------------|----------|-----|
| アプレピタントカプセル 125mg | 1Cap 分 1 | 1日分 |
| アプレピタントカプセル 80mg  | 1Cap 分 1 | 2日分 |