

レジメン名 (治療名)					
GEM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
卵巣癌	GEM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ゲムシタビン【GEM】	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン			
備考					

≪投与順≫

Day1、8、15

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 100mL | |
| <u>デキサメタゾン 8mg</u> | 1A | 30分 |
| (2) 5%ブドウ糖液 | 100mL | |
| <u>ゲムシタビン</u> | 1000mg/m ² | 30分 |
| (3) 生理食塩液 | 50mL | 5分 |