

レジメン名 (治療名)					
NGT					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
卵巣癌	NGT	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ノギテカン【NGT】	1.25mg/m ²	点滴静注	30分	Day1-5
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、ファモチジン			
備考		卵巣癌患者に対するノギテカンガイドライン 2004年より広範な前治療を有する場合、または白金製剤による前治療を実施している場合は、1.25mg/m ² に減量して開始する。とあったため、初回投与量を上記のように設定。			

《投与順》

Day1-5

- | | | |
|-------------|-----------------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 100mL | |
| デキサメタゾン 8mg | 1V | |
| ファモチジン 20mg | 1A | 30分 |
| (2) 生理食塩液 | 100mL | |
| ノギテカン | 1.25mg/m ² | 30分 |
| (3) 生理食塩液 | 50mL | 10分 |