

レジメン名 (治療名)					
PLD					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
卵巣癌	PLD	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ドキソルビシン【PLD】	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		12コースまで 参考値：total PLD ≤ 500mg/m <sup>2</sup> (ドキソルビシンの上限)			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、オンダンセトロン、ファモチジン			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドキソルビシン (PLD) の投与速度 ≧ 1mg/min を保つように設定。ただし、急速な投与により infusion reaction を起こす危険あり</li> <li>・点滴ルートにインラインフィルターを使用しない</li> <li>・前治療に白金製剤を使用していること</li> </ul>			

《投与順》

- |              |                     |     |
|--------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液    | 50mL                |     |
| ファモチジン 20mg  | 1A                  |     |
| デキサメタゾン 8mg  | 1V                  | 15分 |
| (2) 5%ブドウ糖液  | 100mL               |     |
| オンダンセトロン 4mg | 1A                  | 30分 |
| (3) 5%ブドウ糖液  | 250mL               |     |
| ドキシル         | 40mg/m <sup>2</sup> | 90分 |
| (4) 5%ブドウ糖液  | 100mL               | 30分 |