

レジメン名 (治療名)					
TC 療法					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
卵巣癌	TC 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1, 8等)
1	パクリタキセル【PTX】	175mg/m ²	点滴静注	3時間	Day1
2	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=5	点滴静注	1時間	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3~4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		6クールまで。6ヶ月以上あけて再発した場合に再開可能。			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、オンダンセトロン、ファモチジン クロルフェニラミン、アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・CBDCA アレルギーが出現した場合は、PTX 単剤へ変更。その際には軽度催吐性のため、アプレピタントの処方なし。 ・CBDCA の投与量は主治医の判断で AUC=6 まで増量可能。 			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL		
ファモチジン 20mg	1A		
デキサメタゾン 8mg	3V	15分	
(2) 生理食塩液	100mL		
クロルフェニラミン 5mg	1A		
オンダンセトロン 4mg	1A	30分	
(3) 生理食塩液	500mL		
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	
(4) 5%ブドウ糖液	250mL		
カルボプラチン	AUC=5	1時間	
(5) 生理食塩液	50mL	5分	

内服制吐剤

アプレピタントカプセル 125mg	1Cap 分 1	1日分
アプレピタントカプセル 80mg	1Cap 分 1	2日分