

レジメン名 (治療名)					
nabPTX+アテゾリズマブ					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
乳癌	nab-PTX+ アテゾリズマブ	■入院 ■外来	■進行・再発 □術後補助化学療法 □術前補助化学療法	□大量化学療法 □局所化学療法 □その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	アテゾリズマブ	840mg	点滴静注	60分 2回目以降30分	Day1、15
2	アルブミン懸濁型パクリタキセル【nab-PTX】	100mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン			
備考		・PD-L1陽性(≧1%)・トリプルネガティブ(HER2、ER、PgRの発現なし)の乳癌患者を対象。			

《投与順》

Day1、15

(1)	生理食塩液	50mL	5分
(2)	生理食塩液	250mL	
	アテゾリズマブ	840mg	60分(2回目以降30分へ短縮可)
(3)	生理食塩液	50mL	5分
(4)	生理食塩液	50mL	
	デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(5)	生理食塩液	50mL	
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	30分
(6)	生理食塩液	50mL	5分

Day8

(1)	生理食塩液	50mL	
	デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2)	生理食塩液	50mL	
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	30分
(3)	生理食塩液	50mL	5分