

レジメン名 (治療名)					
FOLFIRI					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
大腸癌	FOLFIRI	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	イリノテカン【CPT11】	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1
2	レボホリナート【I-LV】	200mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1
3	フルオロウラシル【5FU】	400mg/m ²	点滴静注	12分	Day1
4	フルオロウラシル【5FU】	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		2-3週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、アプレピタント			
備考		・(5)はHOME POMP C-SERIES C100020を使用。 投与時間が56時間を超える場合は、自己抜針を行って良い。			

《投与順》

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|
| (1) 生理食塩液 | 50mL | |
| デキサメタゾン 8mg | 2V | |
| オンダンセトロン 4mg | 1A | 30分 |
| <hr/> | | |
| (2) 5%ブドウ糖液 | 500mL | |
| イリノテカン | 150mg/m ² | 90分 |
| <hr/> | | |
| (3) ソルデム 3A | 500mL | |
| レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 |
| * (2)、(3)は同時に投与を始める | | |
| <hr/> | | |
| (4) 生理食塩液 | 50mL | 5分 |
| <hr/> | | |
| (5) フルオロウラシル | 2400mg/m ² | |
| *フルオロウラシル 2250mg以下 → 生理食塩液 100mL | | |
| フルオロウラシル 2250mgを超える → 生理食塩液 50mL | | |
| 生理食塩液と合わせて | 全量 95mL | 46時間 |
| <hr/> | | |
| (6) 生食ロック | | 10mL |

内服制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分 1 1日分
 アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分 1 2日分