

レジメン名 (治療名) SP 療法 short hydration (S1+CDDP) +トラスツズマブ					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	SP 療法 +トラスツズマブ	■入院 ■外来	■進行・再発 □術後補助化学療法 □術前補助化学療法	□大量化学療法 □局所化学療法 □その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	シスプラチン【CDDP】	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	Day1
2	トラスツズマブ	6mg/kg 初回時のみ 8mg/kg	点滴静注	初回 90分 2回目以降 30分へ短縮	Day1
3	エヌケーエスワン【S1】	80-120mg/回	経口		Day1 (夕) ~15 (朝) 14日間
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間			
総コース数及び総投与量の限界		CDDP : 500mg/m <sup>2</sup> まで CDDP 上限達した場合、S1+トラスツズマブ PD まで継続可			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、パロノセトロン			
備考		・ Short hydration 行う場合、腎機能正常、年齢 65 歳未満、飲水 1L/day 以上可能な患者であることを確認する。			

《投与順》

Day1

(1)	ラクテック	500mL	2時間
(2)	ソルデム 3A	500mL	
	硫酸 Mg 補正液	8mL	2時間
(3)	生理食塩液	250mL	
	トラスツズマブ	6mg/kg	30分 (2回目以降)
	(初回投与時)	8mg/kg	90分)
(4)	生理食塩液	50mL	
	デキサメタゾン 8mg	2V	
	パロノセトロン 0.75mg	1A	15分
(5)	マンニトール	200mL	30分
(6)	生理食塩液	300mL	
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	2時間
(7)	ソルデム 3A	500mL	2時間
(8)	ラクテック	500mL	2時間

Day2、3 : 飲水 1000mL 以上

内服薬：エヌケーエスワン 80-120mg/day 分2 21日分 day1(夕)～22(朝)  
 制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分  
 アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分  
 デキサメタゾン 0.5mg 8錠分2(朝・昼) 3日分 (day2-4)

トラスツズマブ単独投与 (CDDP 上限に達した後 or CDDP 投与不能時)

(1)	生理食塩液	50mL	10分
(2)	生理食塩液	250mL	
	トラスツズマブ	6mg/kg	30分
(3)	生理食塩液	50mL	10分

内服薬：S1 継続中は S1 を処方

●short hydration を行うときには以下の内容にて治療を行う。

(1)	ラクテック	500mL	1時間
(2)	ソルデム 3A	500mL	
	硫酸 Mg 補正液	8mL	1時間
(3)	生理食塩液	250mL	
	トラスツズマブ	6mg/kg	30分 (2回目以降)
	(初回投与時)	8mg/kg	90分
(4)	生理食塩液	50mL	
	デキサメタゾン 8mg	2V	
	パロノセトロン 0.75mg	1A	15分
(5)	マンニトール	200mL	30分
(6)	生理食塩液	300mL	
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	1時間
(7)	ソルデム 3A	500mL	2時間

\* 適応患者

「CCr>60mL/min、EF>60%、飲水指示に対して十分理解がある」の条件を満たしている場合