

レジメン名 (治療名)					
GEM+CDDP					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胆道癌	GC	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	シスプラチン【CDDP】	25mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1、8
2	ゲムシタビン【GEM】	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、硫酸Mg補正液 アプレピタント			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・血管痛出現時はGEMの希釈液を5%ブドウ糖液へ変更 ・胸部放射線照射患者は禁忌(GEM) ・中等度催吐性のため、5HT3拮抗薬はオンダンセトロンを選択。遅発期の吐気の副作用が強い場合は、パロノセトロンへ変更もしくは、内服デキサメタゾン錠の追加を検討。 			

《投与順》

Day1、8

(1)	生理食塩液	500mL			
	硫酸Mg補正液	8mEq		1時間	
(2)	生理食塩液	50mL			
	オンダンセトロン 4mg	1A			
	デキサメタゾン 8mg	1V		15分	
(3)	生理食塩液	200mL			
	シスプラチン	25mg/m ²		1時間	
(4)	生理食塩液	500mL		1時間	
(5)	生理食塩液	100mL			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²		30分	
(6)	生理食塩液	50mL		5分	

内服制吐剤：アプレピタント 125mg 1 Cap 分 1 1日分(day1、8)
 アプレピタント 80mg 1 Cap 分 1 2日分(day2-3、9-10)