

レジメン名 (治療名)					
FOLFIRI					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
大腸癌	FOLFIRI	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	イリノテカン【CPT11】	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1
2	レボホリナート【I-LV】	200mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1
3	フルオロウラシル【5FU】	400mg/m ²	点滴静注	12分	Day1
4	フルオロウラシル【5FU】	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		2-3週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、アプレピタント			
備考		・(5)はHOME POMP C-SERIES C100020を使用。 投与時間が56時間を超える場合は、自己抜針を行って良い。			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL		
デキサメタゾン 8mg	2V		
オンダンセトロン 4mg	1A		30分
(2) 5%ブドウ糖液	500mL		
イリノテカン	150mg/m ²		90分
(3) ソルデム 3A	500mL		
レボホリナート	200mg/m ²		2時間
* (2)、(3)は同時に投与を始める			
(4) 生理食塩液	50mL		
フルオロウラシル	400mg/m ²		12分
(5) 生理食塩液	50mL		5分
(6) フルオロウラシル	2400mg/m ²		
生理食塩液と合わせて	全量 95mL		46時間
(7) 生食ロック			10mL
内服制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg	1Cap	分1	1日分
アプレピタントカプセル 80m	1Cap	分1	2日分