

レジメン名 (治療名)					
FOLFIRI + BEV					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
大腸癌	FOLFIRI + BEV	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ベバシズマブ【BEV】	5mg/kg	点滴静注	90分 2回目以降60分 3回目以降30分	Day1
2	イリノテカン【CPT11】	150mg/m ²	点滴静注	90分	Day1
3	レボホリナート【l-LV】	200mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1
4	フルオロウラシル【5FU】	400mg/m ²	点滴静注	12分	Day1
5	フルオロウラシル【5FU】	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	Day1-2
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		2-3週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デキサメタゾン、アプレピタント			
備考		・(6)はHOME POMP C-SERIES C100020を使用。 投与時間が56時間を超える場合は、自己抜針を行って良い。			

≪投与順≫

(1) 生理食塩液	50mL	
デキサメタゾン 8mg	2V	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
<hr/>		
(2) 生理食塩液	100mL	
ベバシズマブ	5mg/kg	90分
* 忍容性を認めた場合は、2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能		
(2) 5%ブドウ糖液	500mL	
イリノテカン	150mg/m ²	90分
<hr/>		
(3) ソルデム 3A	500mL	
レボホリナート	200mg/m ²	2時間
* (2)、(3) は同時に投与を始める		
(4) 生理食塩液	50mL	
フルオロウラシル	400mg/m ²	12分
<hr/>		
(5) 生理食塩液	50mL	5分
<hr/>		
(6) フルオロウラシル	2400mg/m ²	
生理食塩液と合わせて	全量 100mL	46時間
<hr/>		
(7) 生食ロック		10mL

支持療法

アプレピタントカプセル 125mg	1Cap 分 1	1日分
アプレピタントカプセル 80mg	1Cap 分 1	2日分