

レジメン名 (治療名)					
SOX 療法 (S1+オキサリプラチン)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
大腸癌	SOX	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	オキサリプラチン 【L-OHP】	130mg/m ²	点滴静注	2時間	Day1、
	エヌケーエスワン【S1】	80mg/m ² /day	内服	朝夕食後	Day1 (夕) ~ Day15 (朝) 14日分
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと (LOHP: day1、S1: day1 (夕) ~15 (朝) 内服後1週間休薬)			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン			
備考		・血管予防のため、末梢点滴時はブドウ糖液 500mL にデキサメタゾン 8mg 0.5V を追加する。			

《投与順》

(1) 生理食塩液	50mL	
デキサメタゾン 8mg	2V	
ファモチジン 20mg	1A	
クロルフェニラミン 5mg	1A	
オンダンセトロン 4mg	1A	30分
(2) 5%ブドウ糖液	500mL	
デキサメタゾン 8mg (ポート留置者不要)	0.5V	
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間
(3) 生理食塩液	50mL	5分

内服抗がん剤：S1 80mg/m²/day 1日2回 朝夕食後 14日分

*吐気に応じて下記を適宜追加検討。

内服制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分
アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分