

レジメン名 (治療名)					
SP short hydration (S1+CDDP)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	SP	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	シスプラチン【CDDP】	60mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1
2	エヌケーエスワン【S1】	80-120mg/回	経口		Day1 (夕) ~22 (朝) 21日間
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		5週間			
総コース数及び総投与量の限界		CDDP：500mg/m ² まで S1：PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		パロノセトロン、デキサメタゾン、硫酸Mg補正液 フロセミド、アプレピタント			
備考		・初回入院時に Grade2 以上の嘔気・嘔吐、腎障害出現時は、次回より入院にて実施を検討する。 ・本レジメンは腎機能正常、LVEF≧60%、飲水 1L/day 以上可能な患者に使用すること。			

《投与順》

Day1

- | | | |
|----------------|---------------------|-------|
| (1) ラクテック | 500mL | |
| 硫酸 Mg 補正液 | 8mEq | 1 時間 |
| (2) ラクテック D | 500mL | 1 時間 |
| (3) 生理食塩液 | 100mL | |
| デキサメタゾン 8mg | 2V | |
| パロノセトロン 0.75mg | 1A | 10 分間 |
| (4) 生理食塩液 | 300mL | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 1 時間 |
| (5) ラクテック | 500mL | 1 時間 |
| (6) 生理食塩液 | 50mL | |
| フロセミド 20mg | 1A | 10 分間 |
| (7) ラクテック D | 500mL | 1 時間 |

Day2、3：飲水 1000mL 以上

内服薬：エヌケーエスワン 80-120mg/day 分2 21日分 day1 (夕) ~22 (朝)

制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分

アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分

デキサメタゾン 0.5mg 8錠分2 (朝・昼) 3日分 (day2-4)