

レジメン名 (治療名)					
PTX+RAM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	PTX+RAM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ラムシルマブ【RAM】	8mg/kg	点滴静注	60分	Day1、15
2	パクリタキセル【PTX】	80mg/m ²	点滴静注	60分	Day1、8、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・ラムシルマブ投与中の infusion reaction 発現時の対応 Grade1 or 2→ラムシルマブの投与速度を 50%減速 Grade3 or 4→ラムシルマブの投与を直ちに中止 ・ラムシルマブ：10%以上体重の変動があった場合は投与量を検討 ・サラムシルマブ休薬時は day8 の処方内容で治療を行う。 			

《投与順》

Day1、15

(1) 生理食塩液	100mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	
ファモチジン 20mg	1A	
クロルフェニラミン 5mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V (初回のみ 2V)	30分
(2) 生理食塩液	50mL	5分
(3) 生理食塩液	250mL	
ラムシルマブ	8mg/kg	1時間
(4) 生理食塩液	50mL	初回 1時間 (2回目以降 5分)
(5) 生理食塩液	250mL	
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間
(6) 生理食塩液	50mL	5分

Day8

(1) 生理食塩液	100mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	
ファモチジン 20 mg	1 A	
クロルフェニラミン 5mg	1 A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30 分
(2) 生理食塩液		
パクリタキセル	80mg/m ²	1 時間
(3) 生理食塩液	50mL	5 分

* 内服制吐剤：原則なし