

レジメン名 (治療名)					
SOX 療法 (S1+オキサリプラチン)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	SOX	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	オキサリプラチン 【L-OHP】	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	Day1
2	エヌケーエスワン【S1】	80mg/m <sup>2</sup> /day	内服	朝夕食後	Day1 (夕) ~ Day15 (朝) 14日分
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと (LOHP: day1、S1: day1 (夕) ~15 (朝) 内服後1週間休薬)			
総コース数及び総投与量の限界		術後: 8コース 進行再発: PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン、クロルフェニラミン ファモチジン			
備考		・血管予防のため、末梢点滴時はブドウ糖液 500mL にデキサメタゾン 0.5V を追加する。			

《投与順》

- |                        |                      |     |
|------------------------|----------------------|-----|
| (1) 生理食塩液              | 50mL                 |     |
| デキサメタゾン 8mg            | 2V                   |     |
| ファモチジン 20mg            | 1A                   |     |
| クロルフェニラミン 5mg          | 1A                   |     |
| オンダンセトロン 4mg           | 1A                   | 30分 |
| <hr/>                  |                      |     |
| (2) 5%ブドウ糖液            | 500mL                |     |
| デキサメタゾン 8mg (ポート留置者不要) | 0.5V                 |     |
| オキサリプラチン               | 100mg/m <sup>2</sup> | 2時間 |
| <hr/>                  |                      |     |
| (3) 生理食塩液              | 50mL                 | 10分 |

内服抗がん剤: S1 80mg/m<sup>2</sup>/day 1日2回 朝夕食後 14日分

\*嘔気出現に応じて下記の処方追加検討する。原則内服制吐剤の処方なし。

内服制吐剤: アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分  
 アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分