

レジメン名 (治療名)					
GEM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
膵癌	GEM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ゲムシタビン【GEM】	800~1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8、15
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン			
備考		・血管痛出現時は GEM の希釈液を 5%ブドウ糖液へ変更			

≪投与順≫

- | | | |
|--------------|-----------------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 50mL | |
| オンダンセトロン 4mg | 1A | |
| デキサメタゾン 8mg | 1V | 30分 |
| (2) 生理食塩液 | 100mL | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 |
| (3) 生理食塩液 | 50mL | 5分 |