

レジメン名 (治療名)						
GEM + nabPTX						
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分			
膵癌	GN	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他		
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)	
1	ゲムシタビン【GEM】	1000mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8、15	
2	アルブミン懸濁型パクリタキセル 【nabPTX】	125mg/m ²	点滴静注	30分	Day1、8、15	
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間ごと				
総コース数及び総投与量の限界		PDまで				
プレメディケーション ポストメディケーション		オンダンセトロン、デキサメタゾン				
備考		・血管痛出現時は GEM の希釈液を 5%ブドウ糖液へ変更				

≪投与順≫

(1) 生理食塩液	50mL	
オンダンセトロン 4mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 生理食塩液	100mL	
アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	30分
(3) 生理食塩液	50mL	5分
(4) 生理食塩液	100mL	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
(5) 生理食塩液	50mL	5分