

| レジメン名 (治療名) | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| SP (S1+CDDP) + Trastuzumab short hydration | | | | | |
| 癌腫 | レジメン (略語) | 実施区分 | 抗がん剤適応区分 | | |
| 胃癌 | SP +トラスツズマブ | ■入院 ■外来 | ■進行・再発 □術後補助化学療法 □術前補助化学療法 | □大量化学療法 □局所化学療法 □その他 | |
| 投与順 | 抗がん剤名 (商品名・略称) | 1日投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 (day1、8等) |
| 1 | シスプラチン【CDDP】 | 60mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | Day1 |
| 2 | トラスツズマブ | 6mg/kg 初回時のみ 8mg/kg | 点滴静注 | 初回 90分 2回目以降 30分へ短縮 | Day1 |
| 3 | エヌケーエスワン【S1】 | 80-120mg/回 | 経口 | | Day1 (夕) ~15 (朝) 14日間 |
| 1コースの期間 (次コースまでの標準期間) | | 3週間 | | | |
| 総コース数及び総投与量の限界 | | CDDP : 500mg/m ² まで CDDP 上限達した場合、S1+トラスツズマブをPDまで継続可 | | | |
| プレメディケーション ポストメディケーション | | パロノセトロン、デキサメタゾン、硫酸Mg補正液 フロセミド、アプレピタント | | | |
| 備考 | | ・Short hydration 行う場合、腎機能正常、LVEF≧60%、飲水 1L/day以上可能な患者であることを確認する。 ・CDDP 投与上限に達した場合は S1+トラスツズマブまたはトラスツズマブ単剤で治療継続する。 | | | |

《投与順》

| | | | |
|-----|----------------|---------------------|-------------|
| (1) | ラクテック | 500mL | 1時間 |
| (2) | ソルデム 3A | 500mL | |
| | 硫酸 Mg 補正液 | 8mL | 1時間 |
| (3) | 生理食塩液 | 250mL | |
| | トラスツズマブ | 6mg/kg | 30分 (2回目以降) |
| | (初回投与時) | 8mg/kg | 90分) |
| (4) | 生理食塩液 | 50mL | |
| | デキサメタゾン 8mg | 2V | |
| | パロノセトロン 0.75mg | 1A | 15分 |
| (5) | マンニトール | 200mL | 30分 |
| (6) | 生理食塩液 | 300mL | |
| | シスプラチン | 60mg/m ² | 1時間 |
| (7) | ソルデム 3A | 500mL | 2時間 |

内服薬：エヌケーエスワン 80-120mg/day 分2 21日分 day1(夕)～22(朝)
制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分
アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分
デキサメタゾン 0.5mg 8錠分2(朝・昼) 3日分 (day2-4)

Day2、3：飲水 1000mL 以上

トラスツズマブ単独投与 (CDDP 上限に達した後 or CDDP 投与不能時)

| | | |
|------------------|-------------|------------|
| (1) <u>生理食塩液</u> | <u>50mL</u> | <u>10分</u> |
| (2) 生理食塩液 | 250mL | |
| トラスツズマブ | 6mg/kg | 30分 |
| (3) <u>生理食塩液</u> | <u>50mL</u> | <u>10分</u> |

内服薬：S1 継続中は S1 を処方