

レジメン名 (治療名)					
CBDCA+PEM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
非小細胞 肺腺癌	CBDCA+PEM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ペメトレキセド【PEM】	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	12分	Day1
2	カルボプラチン 【CBDCA】	AUC=6	点滴静注	1時間	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週ごと			
総コース数及び総投与量の限界		CBDCA+PEMとして4~6コース行う。 その後PEM単剤維持療法を3週ごとに継続する。有害事象出現またはPDまで。			
プレメディケーション ポストメディケーション		パロノセトロン、デキサメタゾン、ファモチジン			
備考		PEM 関連事項 ・NSAIDsとの併用は原則行わない ・投与7日間以上前からPEM最終投与日以降22日目までの期間以下を行う。 1) 葉酸 (フォリアミン) 0.5mg分1 連日経口内服 2) ビタミンB12の筋注 9週ごと  CBDCA 関連事項 ・投与量はAUC=6が400mg/m <sup>2</sup> 以上になる場合、400mg/m <sup>2</sup> ×体表面積で計算する。 ・内服制吐剤は症状に合わせて、アプレピタント投与可能。その際には、day2、3のデキサメタゾンの内服は省略可能。			

《投与順》

CBDCA+PEM 4~6 コース

(1) 生理食塩液	100mL	
パロノセトロン 0.75mg	1A	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 生理食塩液	100mL	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	12分
(3) 5%ブドウ糖液	250mL	
カルボプラチン	AUC=6	60分
(4) 生理食塩液	50mL	5分

維持療法

(1) 生理食塩液	100mL	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 生理食塩液	100mL	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	12分
(3) 生理食塩液	50mL	5分