

|                           |                   |  |   |  |                  |
|---------------------------|-------------------|--|---|--|------------------|
| レジメン名 (治療名)               |                   |  |   |  |                  |
| DTX                       |                   |  |   |  |                  |
| 癌腫                        | レジメン (略語)         | 実施区分   | 抗がん剤適応区分  |  |                  |
| 非小細胞肺癌                    | DTX               | <input checked="" type="checkbox"/> 入院<br><input checked="" type="checkbox"/> 外来 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発<br><input type="checkbox"/> 術後補助化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 | <input type="checkbox"/> 大量化学療法<br><input type="checkbox"/> 局所化学療法<br><input type="checkbox"/> その他 |                  |
| 投与順                       | 抗がん剤名<br>(商品名・略称) | 1日投与量  | 投与経路  | 投与時間   | 投与日<br>(day1、8等) |
| 1                         | ドセタキセル【DTX】       | 60mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注  | 60分  | Day1             |
| 1コースの期間<br>(次コースまでの標準期間)  |                   | 3週間ごと  |   |  |                  |
| 総コース数及び総投与量の限界            |                   | PDまで   |   |  |                  |
| プレメディケーション<br>ポストメディケーション |                   | デキサメタゾン、クロルフェニラミン、ファモチジン   |   |  |                  |
| 備考                        |                   | ・治療を要する胸水、心嚢液貯留例は禁忌  |   |  |                  |

≪投与順≫

|               |                     |     |
|---------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液     | 100mL               |     |
| クロルフェニラミン 5mg | 1A                  |     |
| ファモチジン 20mg   | 1A                  |     |
| デキサメタゾン 8mg   | 1V                  | 30分 |
| (2) 5%ブドウ糖液   | 250mL               |     |
| ドセタキセル        | 60mg/m <sup>2</sup> | 60分 |
| (3) 生理食塩液     | 50mL                | 5分  |