

レジメン名 (治療名)					
DTX+RAM					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
非小細胞肺癌	DTX+RAM	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ラムシルマブ【RAM】	10mg/kg	点滴静注	60分	Day1
2	ドセタキセル【DTX】	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、クロルフェニラミン、ファモチジン			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・治療を要する胸水、心嚢液貯留例は禁忌</li> <li>・ラムシルマブ投与期間中の胸部放射線治療は行わない。</li> <li>・ラムシルマブ投与計算時から10%以上の体重変動を認めた場合、投与量を再度検討。</li> </ul>			

《投与順》

- |                                   |                     |     |
|-----------------------------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液                         | 100mL               |     |
| クロルフェニラミン 5mg                     | 1A                  |     |
| ファモチジン 20mg                       | 1A                  |     |
| デキサメタゾン 8mg                       | 1V                  | 30分 |
| <hr/>                             |                     |     |
| (2) 生理食塩液                         | 250mL               |     |
| ラムシルマブ                            | 10mg/kg             | 60分 |
| <hr/>                             |                     |     |
| (3) 生理食塩液                         | 50mL                | 60分 |
| *ラムシルマブに対して忍容性を認めた場合は2回目以降5分へ短縮可能 |                     |     |
| <hr/>                             |                     |     |
| (4) 5%ブドウ糖液                       | 250mL               |     |
| ドセタキセル                            | 60mg/m <sup>2</sup> | 60分 |
| <hr/>                             |                     |     |
| (5) 生理食塩液                         | 50mL                | 5分  |