

レジメン名 (治療名)					
エルロチニブ+BEV					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
非小細胞 肺腺癌	エルロチニブ+BEV	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ベバシズマブ【BEV】	15mg/kg	点滴静注	90分 2回目60分 3回目以降30分へ 短縮可能	Day1
2	エルロチニブ【Erl】	150mg	経口		連日
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週ごと			
総コース数及び総投与量の限界		有害事象出現またはPDまで。			
プレメディケーション ポストメディケーション		なし			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・禁忌：2.5mL以上の鮮血喀痰既往、脳転移を有するもの</li> <li>・BEV投与中の胸部放射線療法は施行しない</li> <li>・本剤投与期間中は胸部放射線をあてない。</li> </ul>			

《投与順》

(1) 生理食塩液 50mL 5分

(2) 生理食塩液 100mL  
 ベバシズマブ 15mg/kg 90分

\* 忍容性を認めた場合は2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能

(3) 生理食塩液 50mL 5分