

レジメン名 (治療名)					
CBDCA+CPT11					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
小細胞肺癌	CBDCA+CPT11	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	イリノテカン【CPT11】	50mg/m ²	点滴静注	90分	Day1、8、15
2	カルボプラチン【CBDCA】	AUC=5	点滴静注	60分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		4～6コース			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、ファモチジン、パロノセトロン			
備考		CBDCA 投与量は Calvert の式から算出する。 Calvert の式：CBDCA 投与量 (mg/body) = AUC × (GFR + 25)			

≪投与順≫

Day1

- | | | |
|----------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 100mL | |
| パロノセトロン 0.75mg | 1V | |
| ファモチジン 20mg | 1A | |
| デキサメタゾン 8mg | 1V | 30分 |
| (2) 5%ブドウ糖液 | 250mL | |
| イリノテカン | 50mg/m ² | 90分 |
| (3) 生理食塩液 | 50mL | 15分 |
| (4) 5%ブドウ糖液 | 250mL | |
| カルボプラチン | AUC=5 | 60分 |
| (5) 生理食塩液 | 50mL | 5分 |

Day8、15 (WBC>3000/mm³、血小板数>10万/mm³、重症な下痢がないことが条件)

- | | | |
|----------------|---------------------|-----|
| (1) 生理食塩液 | 100mL | |
| パロノセトロン 0.75mg | 1V | |
| ファモチジン 20mg | 1A | |
| デキサメタゾン 8mg | 1V | 30分 |
| (2) 5%ブドウ糖液 | 250mL | |
| イリノテカン | 50mg/m ² | 90分 |
| (3) 生理食塩液 | 50mL | 5分 |