

レジメン名 (治療名)					
CDDP+CPT11 Short hydration					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
小細胞肺癌	CDDP+CPT11	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	イリノテカン【CPT11】	60mg/m ²	点滴静注	90分	Day1、8、15
2	シスプラチン【CDDP】	60mg/m ²	点滴静注	60分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		4週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		4～6コース			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、ファモチジン、パロノセトロン マンニトール、硫酸Mg補正液			
備考		・飲水指示・：1日目から3日目に飲水1000mL/dayを行う。経口補液OS1での補給を推奨。 ・以下の条件を満たしていることを確認。 1) 年齢75歳以下 2) PS0-1 3) 心エコーによる左室駆出率50%以下、拡張障害は除外 4) 肝機能、腎機能正常 5) 処置を必要とする胸水・心嚢水がない 6) 除外：上大動脈症候群、肺全摘、コントロール不良のDM			

≪投与順≫

Day1

(1)	ソルデム 1液	500mL	1時間
(2)	ソルデム 3A液	500mL	
	硫酸Mg補正液	8mEq	1時間
(3)	生理食塩液	100mL	
	パロノセトロン 0.75mg	1V	
	ファモチジン 20mg	1A	
	デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(4)	5%ブドウ糖液	250mL	
	イリノテカン	60mg/m ²	90分
(5)	マンニトール 20%	200mL	30分
(6)	生理食塩液	300mL	
	シスプラチン	60mg/m ²	1時間
(7)	ソルデム 1液	500mL	1時間

Day8、15（重症な下痢がないことが条件）

(1) 生理食塩液	50mL	
パロノセトロン 0.75mg	1V	
ファモチジン 20mg	1A	
デキサメタゾン 8mg	1V	30分
(2) 5%ブドウ糖液	250mL	
イリノテカン	60mg/m ²	90分
(3) 生理食塩液	50mL	5分